

POTENZA [ポテンツァ] マイクロニードル RF 治療説明・同意書

- 1) 微小な針で、皮膚に微細な穴を無数に開けることで創傷治癒効果（修復機能）を高めます。また、同時に高周波の熱を加えることでコラーゲンやエラスチンなどの増生を促し、肌質や瘢痕を改善させていく治療です。
ニキビ跡、肌の張りやキメ、毛穴の開き、小じわの改善を主な目的とします。
薬剤（BENEVE[成長因子]やMcCoom[PLLA]など）を併用し、皮下に導入することで効果がより強くなります。
4週に1度の間隔で、3～5回ほどの施術を1クールとして推奨しております。
治療効果には個人差があり、際立った改善が見られない場合もあります。
- 2) 熱を伴う痛みのある治療です。表面麻酔をしますが、比較的痛みが強い治療です。施術後、数時間はヒリヒリとする痛みが出ることがあります。治療後は全体的に赤みが出ますが、ほとんどの方は2～3時間程度で改善します。赤みや腫れが残りやすい方は翌日まで続くことがあります。部位によって出血が生じることもあります。内出血は3日～2週間程度で改善します。治療翌日～1週間程度、お肌がカサカサすることがあります。角質が自然に脱落するまで、無理にこすらないようにしてください。
- 3) 治療後当日は、洗顔、入浴を避けてください。医療機関指定の化粧品しか使用できません。翌日（強い治療の場合は24時間以降）より洗顔、入浴、化粧水等の使用、メイクが可能ですが、角質除去剤やスクラブの使用、美白化粧品（レチノール、AHA含有）の使用は1～2週間控えてください。こすったり、引っ掻いたりせず、できるだけ刺激を与えないようにしましょう。治療期間中は日焼け止めと保湿剤を使用する必要があります。施術部位に赤みや腫れがある場合は、激しい運動、過度の飲酒、サウナ、入浴など体を熱する行為はお控えください。
- 4) 経過をみる目的で写真を撮影させていただきます。写真に関しては厳重に保管し、患者様との経過観察以外で無断使用することはありません。

[施術・治療の副作用や併発症（免責）]

- 1) 施術・治療には副作用や併発症（ざ瘡、毛囊炎、点状出血、感染症、紅斑、水疱、瘢痕形成、色素脱失、長期の色素沈着等）が発生する可能性がございます。また、極まれですが、塗布する麻酔薬、成長因子等の薬剤にアレルギーを起こす場合があります。あらかじめご理解・ご同意ください。
- 2) 副作用や併発症が発生した場合には、状態の写真を撮影のうえで、当該写真のご送付とともに速やかに当院までご連絡ください。当院の指示に従い、診察が必要と判断された場合にはご来院ください。
- 3) 副作用や併発症が発生した場合の、当院における副作用や併発症に関する治療費については次のとおりです。
 - ・ 当院に過失が認められない場合：ご本人の負担
 - ・ 当院に過失が認められる場合：当院の負担（ただし、施術日から1週間以内に、状態の写真のご送付及びご連絡をいただけない場合や、当院のご指示にしたがっていただけない場合には、ご本人の負担となります。）
 - ・ 当院に故意又は重過失が認められる場合：当院の負担

以上の内容につき、納得理解しましたので、治療を受けることに同意いたします。