

リジュラン治療説明・同意書

1. リジュランとは、サーモンから抽出したポリヌクレオチドを皮膚に注射することで、細胞の再生と成長を促す治療です。線維芽細胞などの再生力を活性化させ、表皮から真皮にかけて若返らせます。「しわの改善」「肌のハリ、キメの改善」「毛穴の引き締め」といった効果があります。
 2. リジュランiは目周りの皮膚が薄い部分に適した製剤となっております。2週間から4週間くらいで効果が現れ始め、肌のハリや気になる目元のシワの改善が期待できます。
 3. リジュランHBはリジュランに非架橋ヒアルロン酸と麻酔薬が加えられた製剤です。全顔、首、手の甲などに使用可能です（部位によってはリジュランiをおすすめする場合がございます）。非架橋ヒアルロン酸により比較的早い時期から肌に潤いやツヤ感が出ます。2週間から4週間くらいでリジュランの効果も現れ始め、肌のハリ・小じわの改善が期待できます。
 4. リジュラン+ボトックスは、上記のリジュランに米国アラガン社製の「ボトックスビスタ」を配合した治療です。
- リジュランの肌のハリ・小じわの改善効果に加え、ボトックスによるしわの予防、皮脂の抑制、毛穴の改善などの効果を一度の施術で得ることができます。
5. 施術直後より注入部に膨隆が起こりますが、翌日には治まります。
 6. 個人差はありますが、内出血が起こります。内出血が出た場合、数日から1週間くらいで引いてきます。内出血に関しては、翌日よりメイクで隠していただくことが可能です。
 7. 刺入時と注入時に痛みを感じる場合がございます。リジュランHBは薬剤自体に麻酔薬が含まれているので、痛みが抑えられます。リジュランiには麻酔が含まれませんが、オプションで麻酔薬を配合することができます。また、ブロック麻酔を行うとより強力に痛みを和らげることができます。歯科麻酔など、麻酔薬で気分が悪くなったご経験がある方は事前に申し出てください。
 8. 通院回数 最初は2〜3週間の間隔で3、4回の治療を受けていただくと効果的です。それ以降は3ヶ月〜半年おきのメンテナンスをおすすめします。
 9. 施術部位に関しては翌日からメイクが可能です。強くこすったり、マッサージをすることはさけてください。
 10. 洗顔、シャワーは当日から可能です。入浴は翌日から可能です。当日の激しい運動は控えください。

【施術・治療の副作用や併発症（免責）】

- 1) 施術・治療には副作用や併発症（内出血、疼痛、腫れ、硬結、色素沈着、血管閉塞、アレルギー、感染等）が発生する可能性があります。あらかじめご理解・ご同意ください。
- 2) 副作用や併発症が発生した場合には、状態の写真を撮影のうえで、当該写真のご送付とともに速やかに当院までご連絡ください。当院の指示に従い、診察が必要と判断された場合にはご来院ください。
- 3) 副作用や併発症が発生した場合の、当院における副作用や併発症に関する治療費については次のとおりです。
 - ・当院に過失が認められない場合：ご本人の負担
 - ・当院に過失が認められる場合：当院の負担（ただし、施術日から1週間以内に、状態の写真のご送付及びご連絡いただけない場合や、当院のご指示にしたがっていただけない場合には、ご本人の負担となります。）
 - ・当院に故意又は重過失が認められる場合：当院の負担

以上の内容に付き、納得理解しましたので、治療を受けることに同意いたします。

年 月 日

氏名

ボトックスを含む施術をご希望の方は次ページのボトックスの同意書も前もってご確認をお願いいたします。

「ボトックスビスタ®」による治療を受けられる方へ

1. あなたの受ける治療法について

ボトックスの作用で筋肉の収縮を弱め、しわの改善、小顔などを目的とした治療です。

2. ボトックスビスタ®の成分について

ボトックスビスタ®は、ボツリヌス菌の作り出すA型ボツリヌス毒素（天然のタンパク質）を有効成分とする薬剤です。ボツリヌス菌を注射するわけではありませんので、ボツリヌス菌に感染するといった危険性はありません。様々な研究の結果、このタンパク質を極少量緊張している筋肉に直接注射すると、その筋肉が弛緩することが分かり、医薬品として利用されるようになりました。

3. ボトックスビスタ®の効果について

神経と筋肉の間では、アセチルコリンという化学伝達物質が放出されて神経の刺激が筋肉に伝わり筋肉が収縮します。本剤を注射することによって、一定期間筋肉の収縮を抑制します。

この薬の効果は投与後2-3日目から現われ、通常3～4ヶ月持続します。その後時間の経過と共に効果が消失し、投与前の状態に戻ります。この場合ボトックスビスタ®を再投与することによって同様の効果が現れます。

この薬剤はタンパク質が主成分であるため、治療を続けていくうちに、極まれに体内に抗体が作られ、効果が減弱する可能性があります。

治療には副作用が発症する可能性もあることをご理解いただいた上で治療をお受けください。治療効果が御期待に添えない場合や副作用が発症した場合でも治療費の返還はありません。また、副作用にかかる治療費は患者様ご本人のご負担になりますことをご了承ください。

以下、「5. ボトックスビスタ®による治療を受ける際の注意点」をご確認いただき、ご同意いただける場合には、チェックボックスにチェック☑を入れて下さい。

5. ボトックスビスタ®による治療を受ける際の注意点

【投与前】

- 全身性の筋肉の病気（重症筋無力症、ランバート・イートン症候群など）の場合は使用できません。
- 妊娠中、妊娠している可能性のある方には使用できません。
- ボトックスビスタ®の投与中、および最終投与後2回の月経を経るまでは避妊する必要があります。男性は3ヶ月避妊してください。
- この薬剤を以前に使用しアレルギーを経験したことのある場合やアレルギー体質の方には投与できません。
- 使用中の薬剤がある場合は医師に申し出てください。特に抗生物質、筋弛緩剤、精神安定剤などの投与を受けている方は申し出てください。
- 喘息などの慢性的な呼吸器の疾患のある方は医師に申し出てください。

【投与後】

- 注射当日は洗顔は問題ありませんが、注射部位を揉んだり強くこすったりしないでください。
- 薬剤を注射した部位がはれぼったい感じや、眉毛が上がったり下がったりした感じ、目の周囲の腫れ、まぶたが重くかぶさった感じ、一時的な表情の変化、ひたいが締め付けられるような頭痛を感じる場合があります。このような症状には個人差がありますが、1週間から1ヶ月で消失しますので安心ください。
- 注射部位に内出血を起こすことがあります。
- 脱力感、筋力低下、めまい、視力低下が現れることがあるので、自動車の運転等の危険を伴う機械の操作はご注意ください。

※ 経過観察をする目的で施術部位の写真をお撮りさせていただくことがございます。撮影させていただいた写真に関しては、厳重に保管し患者様との経過観察以外で無断使用することはありませんのでご安心ください。

年 月 日

氏 名