サーマクール CPT/FLX System　治療説明・同意書

１）サーマクールは、RF（高周波）による熱発生を利用し、皮膚を冷却保護しながら皮膚および皮下組織を加熱することで、コラーゲンの収縮・生成を促し、たるみや肌質を改善させることを目的とした治療です。
施術から 2～4 ヵ月後に効果のピークを迎え、その後緩やかに効果が減少していきます。
月に 1 回程度、他の熱治療で効果を維持しながら、6 ヵ月に 1 度の間隔での継続治療を推奨しております。
治療効果には個人差があり、際立った改善が見られない場合もあります。

２）連続で照射をした際に、熱感が辛くない程度のところを上限にパワーを調節していきます。痛みの感じ方には個人差がありますが、骨に近い箇所、口角横、顎下、首等、部分的に痛みを強く感じることがあります。
治療後は全体的にほんのりと赤みが出ることがありますが、通常 2～3 時間程度で改善します。赤みや腫れが残りやすい方は 3 日～1 週間程度続くことがあります。ひりつきがある場合はアイスパックで冷やしてください。
翌日になっても真っ赤に腫れていたり、部分的に火傷の症状が疑われるような場合はすぐにご連絡ください。
ごく稀に、一過性麻痺が起こる場合がありますが、通常、数時間～数週間で自然に消滅します。

３）治療後当日から、洗顔、シャワー、メイクが可能です。入浴、サウナ、運動、飲酒は翌日から可能になります。
角質除去剤やスクラブの使用、美白化粧品（レチノール、AHA 含有）の使用は 1 週間程度控えてください。
治療期間中は日焼け止めと保湿剤を使用する必要があります。施術部位に赤みや腫れがある期間は、入浴、サウナ、激しい運動、過度の飲酒など体を熱する行為をお控えください。

４）経過をみる目的で写真を撮影させていただきます。写真に関しては厳重に保管し、患者様との経過観察以外で無断使用することはありません。

［施術・治療の副作用や併発症（免責)］

１）施術・治療には副作用や併発症（熱傷、水疱形成、瘢痕形成、紅斑、浮腫、一過性麻痺、長期の色素沈着等)が発生する可能性がございます。あらかじめご理解・ご同意ください。

２）副作用や併発症が発生した場合には、状態の写真を撮影のうえで、当該写真のご送付とともに速やかに当院までご連絡ください。当院の指示に従い、診察が必要と判断された場合にはご来院ください。

３）副作用や併発症が発生した場合の、当院における副作用や併発症に関する治療費については次のとおりです。

- 当院に過失が認められない場合：ご本人の負担
- 当院に過失が認められる場合：当院の負担（ただし、施術日から 1 週間以内に、状態の写真のご送付及びご連絡をいただけない場合や、当院のご指示にしたがっていただけない場合には、ご本人の負担となります。）
- 当院に故意又は重過失が認められる場合：当院の負担

以上の内容に付き、納得理解しましたので、治療を受けることに同意いたします。